

ご使用に際して、この添付文書を必ずよくお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保存してください。

指定医薬部外品

外皮消毒剤

ポピドン DRIP CONTROL

販売名：ポピドンヨード液D



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は使用しないでください。

1. 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 患部が広範囲の人
3. 深い傷やひどいやけどの人



相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 本人または家族がアレルギー体質の人
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください。

(1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック（アナフィラキシー）	使用后すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

[効能・効果]

すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒

[用法・用量]

1 日数回患部に塗布または脱脂綿、ガーゼ等に浸して塗布

<用法・用量に関連する注意>

1. 定められた用法・用量を守ってください。
2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
3. 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
4. 外用にのみ使用し、内服しないでください。

[成分]

ポピドンヨード 10w/v% 添加物としてラウロマクロゴール、グリセリン、クエン酸水和物、リン酸水素ナトリウム水和物を含む。

[保管及び取扱い上の注意]

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 誤用の原因になったり品質が変わるおそれがありますので、他の容器に入れ替えないでください。
4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
5. 使用するときに開封し、残液は使用しないでください。
6. 衣服に付着したときには、水で洗い流してください。

[包装]

3mL×60入り、6mL×60入り、10mL×60入り
3mL×120入り、6mL×120入り、10mL×120入り
3mL×240入り、6mL×240入り、10mL×240入り

[消費者相談窓口]

本剤について何かお気付きの点がございましたら、下記連絡先までご連絡いただきますようお願いいたします。

連絡先：ヤクハン製薬株式会社 学術研究部

電話 011-373-1097

受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

製造販売元 **ヤクハン製薬株式会社**

北海道北広島市北の里27番地

販売元 **株式会社アグリス**

福岡県八女市鵜池477-1