

ご使用に際して、この添付文書を必ずよくお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保存してください。


指定医薬部外品

外皮消毒剤



販売名：ヘキシジン液D「アグリス」

 使用上の注意

 **してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の人や部位には使用しないでください。

1. 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 患部が広範囲の人
3. 深い傷やひどいやけどの人
4. 損傷皮膚及び粘膜(エタノールを含有するので、損傷皮膚及び粘膜への使用により、刺激作用を有する。)
5. クロルヘキシジン製剤に対し過敏症の既往症のある患者

 **相談すること**

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 本人または家族がアレルギー体質の人
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください。
(1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	使用后すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

[効能・効果]

すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒

[用法・用量]

1 日数回患部に塗布する。

<用法・用量に関連する注意>

1. 定められた用法・用量を守ってください。
2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
3. 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
4. 外用にのみ使用し、内服しないでください。
5. 石けん類は、本剤の殺菌作用を減弱させるので、予備洗浄に用いた石けん分を十分に洗い落とししてから使用してください。
- * 6. やけどのような痛みを伴う炎症を起こすことがあるので、溶液の状態で長時間皮膚と接触させないでください。

[成分]

クロルヘキシジングルコン酸塩 0.05w/v% 添加物としてエタノールを含む。

[保管及び取扱い上の注意]

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 誤用の原因になったり品質が変わるおそれがありますので、他の容器に入れ替えないでください。
4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
5. 使用するときに開封し、残液は使用しないでください。
6. 衣服に付着したときには、水で洗い流してください。

[包装]

3mL×1～240個入 6mL×1～240個入