

指定医薬部外品

ご使用に際して、この添付文書を必ずよくお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

外皮消毒剤

**アグリ**ヘキシジン

販売名：ヘキシジン液D「アグリS」



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

次の人や部位には使用しないこと

- \*\* 1. 本剤又は本剤の成分、クロルヘキシジンによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2. 患部が広範囲の人。
- 3. 深い傷やひどいやけどの人。
- 4. 損傷皮膚及び粘膜（エタノールを含有するので、損傷皮膚及び粘膜への使用により、刺激作用を有する）。
- 5. クロルヘキシジン製剤に対し過敏症の既往症のある患者。



相談すること

- \*\* 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- \*\* 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

- \*\* 3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒

【用法・用量】

1 日数回患部に塗布する。

<用法・用量に関連する注意>

- 1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- 2. 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。  
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- \* 3. やけどのような痛みを伴う炎症を起こすことがあるので、溶液の状態です長時間皮膚と接触させないこと。
- 4. 外用にのみ使用し、内服しないこと。
- 5. 石けん類は、本剤の殺菌作用を減弱させるので、予備洗浄に用いた石けん分を十分に洗い落としてから使用すること。

【成分】

クロルヘキシジングルコン酸塩 0.05w/v% 添加物としてエタノールを含む。

【保管及び取扱い上の注意】

- 1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- 2. 小児の手の届かない所に保管すること。
- 3. 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。
- 4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
- 5. 使用するときには開封し、残液は使用しないこと。
- 6. 衣類等に付着したときは、水で洗い流すこと。

【包装】

3mL×1～240個入 6mL×1～240個入